Compte rendu de la sortie du vendredi 6 avril 2012

La vallée du Vers aux alentours de Saint-Martin-de-Vers

Wilfried Ratel

Une dizaine de personnes se sont retrouvées à cette première sortie de la SNL. Le rendez-vous avait été donné devant l'église du village de Saint-Martin-de-Vers.

Site visité

1/ versants et pelouses sèches de Verliez

Le matin était consacré à la prospection de quelques pelouses sèches localisées sur le plateau de la vallée du Vers, à l'ouest du lieu-dit Verliez. Il a été décidé de partir à pieds du village ce qui a été l'occasion d'herboriser sur le chemin. Des plantes communes du Quercy ont été rencontrées : Buis *Buxus sempervirens*, Gaïlet érigé *Galium mollugo* subsp. *erectum*, Laïche de Haller *Carex halleriana*, Laïche printanière *Carex caryophylla*, Epervière bleuâtre *Hieracium glaucinum*, Orpin de nice *Sedum sediforme*, Fétuque de Timbal-Lagrange *Festuca marginata*, Cerisier de Sainte-Lucie *Prunus mahaleb*, Laurier des bois *Daphne laureola*, Grande Pervenche *Vinca major*, Psoralée bitumineuse *Bituminaria bituminosa*, Genêt poilu *Genista pilosa*, Origan *Origanum vulgare*, Millepertuis perforé *Hypericum perforatum*...

Cette sortie printanière avait notamment pour objectif de rechercher des chenilles de **Laineuse du prunellier** *Eriogaster catax*, un des seuls papillons nocturnes protégés en France et en Europe. Cette espèce a fait l'objet d'observations sur le Causse de Gramat et sur le plateau de Labastide-Murat en 2011 (W. Ratel). La Laineuse du Prunellier était historiquement connue de la Vallée du Vert (Tristan Lafranchis). Elle a été observée en 2012 au sein de pelouses sèches plus ou moins embroussaillées de la vallée de la Dordogne quercynoise (W. Ratel) ainsi qu'aux alentours de Cahors (V. Heulmé). Les plantes hôtes de cette espèce, pour le moment connues du Lot, sont l'Aubépine monogyne *Crataegus monogyna* et le Prunellier *Prunus spinosa*. Ces plantes ont donc fait l'objet d'une attention particulière lors de cette sortie. Les chenilles de Laineuse du prunellier n'ont malheureusement pas été observées mais celles de la Laineuse du Cerisier l'ont été. Ces chenilles se ressemblent, se retrouvent sur les mêmes plantes et mènent également une existence grégaire en construisant un nid de soie communautaire sur lequel elles thermorégulent.

Chenille de Laineuse du Cerisier sur nid de soie – W. Ratel

Arrivés sur le plateau, nous arrivons sur des pelouses sèches méso-xérophiles et xérophiles avec présence de quelques tonsures à annuelles et rochers affleurants avec notamment présence de la Drave printanière *Draba verna*, du Passerage à calice persistant *Alyssum alyssoides*, du Saxifrage à trois doigts *Saxifraga tridactylites*, de l'Argyrolobe de Linné *Argylobium zanonii*, du Muscari à grappe *Muscari neglectum*, de la Globulaire commune *Globularia bisnagarica*, de la Potentille printanière *Potentilla neumanniana*, de l'Orchis bouffon *Anacamptis morio*, du Pissenlit gracile *Taraxacum gr. erythrospermum*, de la Luzule champêtre *Luzula campestris*, ...

Cette sortie avait également pour but de rechercher les Ophrys précoces, surtout que les deux cartographes des Orchidées du Lot Jean Dauge et Clément Menuet étaient présents. Après une présentation générale des Orchidées réalisée par Jean, nous recherchâmes les Ophrys mais cette année leurs floraisons avaient du retard. Nous arrivons tout de même à trouver un pied en début de floraison d'un Ophrys. Une vérification des différents critères a été faite à l'aide du document « Détermination des Ophrys du groupe Araignée du Lot », téléchargeable sur le site lotnature.fr : <http://www.lotnature.fr/spip.php?article668>

Il s'agit là de l'**Ophrys occidentale** *Ophrys occidentalis*, plante déterminante pour les ZNIEFF en Midi-Pyrénées. D'après la carte de répartition de cet ophrys dans le Lot, cette espèce est courante au niveau du Quercy blanc, des Cévennes du Quercy, du plateau de Labastide-Murat, assez rare dans le Limargue, rare sur les causses de Catus et absente ou à rechercher ailleurs.

Ophrys occidentalis au labelle très sombre observé sur le même site en 2011 - W. Ratel

Etat cartographique de l'*Ophrys occidentalis* en 2011 dans le Lot – Cartographes des Orchidées du Lot

L'heure avançant, nous décidons de redescendre dans le bourg et de pique-niquer sur une petite place munie de bancs.

Nous décidons de repartir à pieds vers la Combe de Bragues observer des milieux plus frais que ceux du matin. Les bois présents sur le versant nord sont des chênaies-charmaies aquitaniennes, milieu d'intérêt patrimonial en Midi-Pyrénées. Des prairies mésophiles à méso-hygrophiles de fauche, autre milieu d'intérêt patrimonial sont également présentes sur tout le fond de ce vallon.

Orage et averse nous font rebrousser chemin assez rapidement. Nous avons tout de même pris le temps d'admirer la Dentaire à sept folioles *Cardamine heptaphylla*, l'Héllébore vert *Helleborus viridis*, le Scille à deux feuilles *Scilla bifolia* et de voir de nombreuses pousses de Lys Martagon *Lilium martagon* ainsi que de Narcisse des poètes *Narcissus poeticus*, plantes déterminantes pour les ZNIEFF en Midi-Pyrénées. Quelques Aurores *Anthocharis cardamine* papillonnent lors des éclaircies.